La Seconde observation que M. Davan a envoyé a l'academie a pour objet une anasarque avec depot profond a l'hypogastre

M Davan fut mandé au mois de mars 1770 a deux lieues de sa ville, pour voir marie battie femme d'un laboureur, agée de 23 ans d'un temperament fort et robuste, ayant depuis trois mois, une enflure oedemateuse, qui occupoit toute l'habitude de son corps; survenue apres une perte de sang considerable dont elle fut traittée par son medecin elle se plaignoit depuis plus de trois semaines d'une vive Douleur, avec élancement, dans le centre de l'hypogastre, il examina cette region a laquelle il trouva un Gonflement qui surpassoit tout le ventre, lequel etoit borné et separé par une ligne enfoncée depuis la region illiaque droite jusques a la gauche; ce qui sembloit former Deux ventres; dans le millieu de l'hypogastre, etoit une tache noire et ronde, de la grandeur d'une piece de douze sols, ou on sentoit une fluctuation profonde, la malade avoit beaucoup de fievre et une forte alteration les choses dans cet etat il jugea quil convenoit, d'ouvrir dans le lieu de la tache. en consequence il fit transversalemt. une incision de la longueur de quatre travers de doigts il en sortit, une serosité rousatre et d'une odeur forte et tres desagreable, environs dix onces, il restoit au fond de la playe un vuide il fit superieurement et au milieu

Vn autre incision moins longue demoitté que la premiere introduisant ensuite son doigt dans le fond il santis sur les muscles droits, vne tention Douloureuse avec fluctuation. il crus dabord quil y avoit dessous dela matiere, ou bien que cela provenoit dela retenue des vrines; la malade lui ayant dit quelle vrinoit peu et avec beaucoup de peine. pour sassurer du fait, il sonda la malade, et il en sortit vn gobelet durine, qui etoit briquettée il examina de nouveau la playe, la tention, la douleur et la fluctuation etoient dans le meme etat, il incisa alors transversallement les muscles apres s'être muni dune éguille enfillée pour faire la ligature de Lartere épigastrique quil devoit ouvrir il fis une incision de la longueur dela premiere il mis fortement son doigt dessus lartere, dont il fis la Ligature, par ce procedé il me paroit que M. Davan ayant fait sa premiere incision transversallement il sen reglé de meme pour faire la seconde il me Semble que sil avoit incisé longitudinallement il auroit pus eviter douvrir lartere épigastrique En parlant d'apres M. Davan il dit quil sassura apres avoir fait son incision sil y avoit vn Kiste et des duretér, au fond dela playe et quil nen trouva pas, je ne peut pas croire quil ait bien reflechis sur

la nature du lieu de ce dépot attendu que je panse
que les gaines dont sonts envellopées les muscles droits
et qui sonts tres fortes devoient servir de planches
a la matiere; ou bien elle se seroit epanchée dans
le ventre ce qui ne peut etre compris autrement
a legard des pansements sans ce compressé donguant
il auroit mieu remplis les indications
il parroit quil fus fort surpris de trouver sa malade
Desenflé, son etonnement ne devoit pourtant pas etre
si grand attendu quil y a nombres dobservations
que de cette espece dydropisie, on a eté guerie par
Des incisions faites en differentes parties
La Maladie qui fait le sujet de cette observation
quoi quelle ne represente rien de particullié pour les
progrés de l'art peut etre regardé comme un fait rare
et qui peut trouver place dans les memoires de
L'academie

La Troisieme observation a pour Sujet une hidropisie
Seiche enkistée suivent l'expression de l'auteur, cette
tumeur occupoit la region lombaire droite et avoit de
Diametre environ trois pouces elle setendoit anterieurement.
et sur tout le cotté de cette region en savansent sur la ligne
blanche a la distance de deux travers de doigts cette
tumeur qui etoit faite par la presence de l'air avoit
succedée a de mauvaises digestions qui occationnoit

a la Malade beaucoups de vents cette observation
ne represente rien qui puisse interesser l'accademie
le fait n'est point rare on a veu souvent de son petites
ouvertures ocationner des enphisemes tres considerable
dallieur on connoit la composition des cellules de la
peau et les annimaux que l'on soufle pour mieu
les separer de leurs peaux en constat la possibilité

Bernot

ACADEMIE NATIONALE MEDECINE BIBLIOTHEQUE